

STERISOL

Käsiendesinfektioaine Rinse

Ominaisuudet

Tuote on alkoholipohjainen. Teho perustuu etanoliin ja denaturointiaineina on isopropanolia ja t-Butanolia. Tuoteeseen lisätty maitohappoesteri ja glyseriini estävät tehokkaasti ihon kuivumisen. Tuotetta voidaan käyttää säännöllisesti ja suuria määriä ilman että se tahmaa käsiä. Tästä syystä myös kertakäyttöhansikkaiden laitto käsiin on huomattavasti helpompaa. Ei värjää kangasta, jota tuotteet jotka sisältävät paksuuntumisainetta voivat tehdä.



Käyttökohteet

Hygieeninen käsiendesinfektio

Tuote soveltuu terveydenhuoltoon, elintarviketeollisuuteen, päiväkoteihin ja muihin tiloihin, missä saippualla pesu ei ole riittävää tai mahdollista.

Kirurginen käsiendesinfektio

Kirurgiseen käsiendesinfektioon tuotetta tulisi käyttää noudattaen kansainvälisiä tai paikallisia ohjeita. Katso käyttöohjeet.

Teho

- Nopea ja tehokas
- Laaja-alainen teho bakteereihin (10 kertaa tehokkaampi kuin pesu vedellä ja saippualla)
- Hyvä teho viruksia vastaan
- Hyvä teho tbc:a vastaan
- Tehoaa sieniin
- Ei tehoa itiöihin

Luokitus

Käsihuuhde hygieeniseen käsien-desinfektioon on luokiteltu biosidivalmisteenasetuksen (EU) N:o 528/2012 - PT1 mukaan.

Ympäristö näkökohdat

Sisältää biohajoavia raaka-aineita. Vähäinen pakkauksen paino. Yksi 700 ml:n pussi sisältää ainoastaan 11 grammaa muovimateriaalia kun perinteinen muovinen pumppupullo sisältää 70 grammaa. Katso myös alta.

Testit

Tuote täyttää:

- EN 1500 - Hygieeninen käsienvesu
- EN 12791 - Kirurginen käsienvesu

Tuote on testattu myös EN 14476 seuraavin kommentein:

- Adenovirus Type 5/Adenoid 75 and Poliomyelitisvirus Type 1 Sabin (Micromun, Greifswald, 2009) Perustuen Käsiendesinfektioaine "Preop" tehtyihin testeihin:
 - Reduces the titre of the Adenovirus Type 5/Adenoid 75 suspension within an incubation time of 30 seconds for 5.22 log₁₀-steps and
 - the titre of the Poliomyelitisvirus 1 suspension was reduced for 4.43 log₁₀-steps within 3 min
- Murine norovirus - A reduction by ≥ 4.00 log₁₀-steps after 30 seconds (MikroLab, Bremen, 2009)
- Human rotavirus - Rekommandation outspädd 15 sekunder (MikroLab, Bremen, 2009)

Raaka-aineet

Tehoaineet: Etanol (70 % w/w), Isopropyl Alcohol (10 % w/w).

Muut raaka-aineet: Aqua, C12-13 Alkyl Lactate, Propylene Glycol, t-Butyl Alcohol, Glycerin

Sisältää alkoholia: 80 % w/w, 85 % v/v



Pakkaus	Tuotenumero	Ltk	Ltk lavas.	Pakk. Lavassa	EAN-koodi	Pakk.mater.p aino/litra tuotetta
700 ml	7108SV-FI-ET	12	72	864	7392173041083	70 gram
Syttyvä neste. Luokka 3. Rajoitettu määrä.					HS 38089490	

Käyttöohjeet

Hygieeninen käsiendesinfektio

Käsien täytyy aina olla täysin kuivat ennen käsiendesinfektioaineen laittamista. Muodosta käteen "kuppi" ja ota vähintään 3ml Sterisol käsiendesinfektioainetta (2 painallusta). Levitä ainetta huolellisesti kaikkialle käsiin. Aloita sormenpäistä ja jatka sormiin ja peukaloihin. Hiero myös ranteisiin ja tarvittaessa kyynärvarsiin. Jatka hieromista kunnes aine on haihtunut ja iho tuntuu jälleen kuivalta. Toista toimenpide.

Kirurginen käsiendesinfektio

1. Ennen Sterisol käsiendesinfektioaineen laittamista, esipese kädet ja kyynärvarret Sterisolin nestesaippualla. Kuivaa kädet ja kyynärvarret huolellisesti käyttäen kertakäyttöistä käsipyyhepaperia.
2. Varmista että hierot käsiin desinfektioainetta vähintään 2*30 sekuntia hygieenisessä käsiendesinfektiossa ja vähintään 3 minuuttia kirurgisessa käsiendesinfektiossa.
3. On olemassa monia tapoja valmistaa kädet, kynnet ja kyynärvarret ennen kirurgisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Tämä ohje on vain yksi esimerkki suosituksista. Kirurgisessa käsiendesinfektiossa tulee seurata paikallista ohjeistusta.

Leikkauskäsineiden rikkoutuminen toimenpiteen aikana:

Jos leikkauskäsineet rikkoutuvat toimenpiteen aikana tulee ne poistaa. Kädet voivat helposti olla kontaminoituneet. Käytä Sterisolin käsiendesinfektioainetta kuten yllä ohjeistettiin.

Tärkeää!

- Poista näkyvä lika ja kuivaa kädet ennen Sterisolin käsiendesinfektioaineen lisäämistä.
- Varmista että hierot käsiin desinfektioainetta vähintään 2*30 sekuntia hygienisessä käsiendesinfektiossa ja vähintään 3 minuuttia kirurgisessa käsiendesinfektiossa.
- On olemassa monia tapoja valmistaa kädet, kynnet ja kyynärvarret ennen kirurgisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Tämä ohje on vain yksi esimerkki suosituksista. Kirurgisessa käsiendesinfektiossa tulee seurata paikallista ohjeistusta.



Annostelija esimerkkejä 0,7l tuotteille



Tuote nro 4551



Tuote nro 4546
Automaattiannostelija



Tuote nro 4567